

biocid

ATAK FUMIGATOR

Účel použití:

Insekticid - vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu (biocidní insekticid - sk. 18). Pro profesionální i neprofesionální uživatele. Umožňuje zcela vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částičky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz. ATAK Fumigator má zpožděné rozptýlení aktivní složky - kouř se začne uvolňovat až několik minut po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem. Bez nebezpečí požáru či výbuchu. Účinnost je rychlá a úplná - uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky.

Návod na použití:

Z prostor určených k ošetření odstraňte veškerá zvířata včetně ryb a neodolné rostliny. Zavřete všechny dveřní a okenní otvory. Otevřete všechna dvířka, zásuvky atd. uvnitř ošetřovaného prostoru. Plastový kelímek umístěte doprostřed plochy, nalijte do něj vodu až do vyznačené úrovně, odtrhněte hliníkový obal plechovky a plechovku umístěte červenou stranou směrem nahoru. Kouř se začne uvolňovat nejdříve za 30 sekund. Při ošetřování velkých prostor použijte několik fumigatorů a jako první aktivujte ty nejvzdálenější od východu. Během fumigace nesmějí být v ošetřovaných prostorech žádné osoby. Fumigator nechte v uzavřeném prostoru působit alespoň 2 hodiny, pro lepší účinek přes noc. Při vstupu do ošetřených prostor otevřete všechny dveře a okna a důkladně vyvětrejte alespoň 5 minut.

Dávkování:

Lezoucí hmyz: (švábi, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci, atd.):
jeden 20 g fumigator na 45 m² nebo 110 m³.

Létavý hmyz: (mouchy, komáři, atd.):
jeden 20 g fumigator na 100 m² nebo 250 m³.

Prachoví roztoči:

jeden 20 g fumigator na 100 m² nebo 250 m³.

Postup aplikace:

1. Zavřete všechny dveře a okna. Otevřete všechna dvířka, skříně a zásuvky atd. uvnitř ošetřovaného prostoru. Odstraňte nebo zakryjte nádoby a potraviny. Z prostor určených k ošetření odstraňte veškeré osoby, rostliny, zvířata a ryby (zakryjte akvárium a po dobu fumigace vypněte čerpadlo na vodu).
2. Fumigator umístěte doprostřed ošetřované místnosti. Odstraňte hliníkový obal plechovky.
3. Nalijte vodu do umělohmotné misky po vyznačenou úroveň (cca 1 cm). Buďte opatrní, nepřekročte tuto úroveň.

4. Kovovou plechovku vložte do umělohmotné misky červenou stranou směrem nahoru. Poznámka: Při ošetřování velkých prostor použijte několik fumigatorů a jako první aktivujte ten nejvzdálenější od východu.

5. Opusťte místnost a zavřete za sebou dveře. Fumigator nechte působit v uzavřeném prostoru alespoň 2 hodiny, ideálně až 4 hodiny. Při vstupu do ošetřených prostor otevřete všechny dveře a okna a důkladně vyvětrejte alespoň 5 minut. Postele nepoužívejte alespoň 6 hodin po fumigaci.

6. Zákaz opakovaného použití obalu. Nepoužitý přípravek nebo prázdný C/HDPE/ALU obal se zbytky přípravku odevezďte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: Okamžitý smrtící účinek.

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata.

Forma přípravku a účinné látky: Granulovaný přípravek, účinná látka: 72 g/kg cyfenothrin (CAS 39515-40-7)

Obsahuje: 1,1'-azodi(formamid), oxid vápenatý

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P391 Uniklý produkt seberte. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním do sběrně nebezpečného odpadu.

UPOZORNĚNÍ: OSOBA POUŽÍVAJÍCÍ TENTO VÝROBEK JE ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLE NESPRÁVNÝM POUŽITÍM PŘÍPRAVKU. PRODÁVAT POUZE V PŮVODNÍM BALENÍ. PO POUŽITÍ NEROZPTYLUJTE OBSAH NÁDOBY DO OVZDUŠÍ.

Zamezte kontaminaci potravin a nápojů při použití. Nepoužívejte v zemědělství. V případě použití přípravku v obytných prostorách je nutné tyto prostory před návratem obyvatel důkladně vyvětrat.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch a po-nechat jej v klidu a teple. V případě přetrvávajících potíží konzultovat s lékařem (informujte lékaře, že se jedná o pyrethroidní insekticid).
Při styku s kůží: Sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout vodou. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody několik minut a konzultovat s lékařem. Při požití: Okamžitě vyhledat lékaře (informujte lékaře, že se jedná o pyrethroidní insekticid). Informace pro lékařský personál: Inhibuje funkci nervového systému. Poradte se s toxikologickým střediskem.

Lékařská pomoc:

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Nepoužití přípravků nebo prázdný obal se zbytky přípravku ODEVZDAT VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených nádobách v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chránit před vodou a vlhkostí.

Číslo šarže, datum výroby a datum expirace: Uvedeno na obale.

Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby.

Číslo oznámení: 58539/2009-SOZ-33.5-15.12.2009

Obsah: 20 g

Výrobce/Držitel povolení: Kwizda-France S.A., 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, Francie

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice, Tel.:+420 553 626 660, www.agrobio.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.